

# Гибриды подсолнечника

**strube**  
Семена. С 1877 г.

Гарантия стабильного урожая







**Ткаченко Олег**  
*Генеральный директор  
ООО «Штрубе Рус»*

145 лет компания Штрубе занимается селекцией зерновых и сахарной свёклы. В сравнении с этим, селекция подсолнечника Штрубе достаточно молодая. Однако, выполняя работу с немецкой четкостью и накопленным опытом, мы движемся в новом для нас направлении быстро и уже добились первых результатов. Предлагаем вашему вниманию линейку гибридов подсолнечника Штрубе - сделано в Германии.



# СОДЕРЖАНИЕ

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Подсолнечник Штрубе .....                  | 06 |
| Технологии Штрубе.....                     | 10 |
| Рекомендации по регионам.....              | 14 |
| Характеристика гибридов подсолнечника..... | 16 |

## КЛАССИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Орфео шт / заразиха G+(H) / средне-ранний (110 дней)..... | 18 |
|-----------------------------------------------------------|----|

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>NEW</b> Баско шт / заразиха G+ (H+) / ранний (98 - 105 дней)..... | 19 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

## УСТОЙЧИВЫЕ К ГЕРБИЦИДАМ (CLEARFIELD/ЕВРОЛАЙТНИНГ)

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Имидор средне-ранний (110 дней)..... | 20 |
|--------------------------------------|----|

## УСТОЙЧИВЫЕ К ГЕРБИЦИДАМ (ЭКСПРЕСС/СУЛЬФО)

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>NEW</b> Целсо шт / заразиха F+(G) / ранний (100 - 105 дней)..... | 21 |
|---------------------------------------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Фаусто шт / средне-ранний (110 дней) ..... | 22 |
|--------------------------------------------|----|

# ШТРУБЕ — КОМПАНИЯ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ



Начиная с 2011 года весь накопленный опыт и традиции компании в сочетании с инновационными технологиями были успешно интегрированы в новое направление — производство семян подсолнечника!


Уже более 140 лет компания Штрубе производит семена высочайшего качества, известные во всем мире. В конце XIX века Фридрих Штрубе начал работу над созданием собственных сортов зерновых и сахарной свёклы. Это открыло путь к невероятному прогрессу в селекции сахарной свёклы.



## 06 OptiStart®

**OptiStart®** - это новая технология дражирования семян подсолнечника от Strube.

Она была разработана на основе многолетнего опыта компании в производстве дражированных и инкрустированных семян.



# opti start®



Однородное развитие



Одновременное цветение



Дружные всходы

## Преимущества OptiStart®

- микроэлементы, аминокислоты фунгициды и инсектициды, включенные в питательный слой обеспечивают надежную защиту и питание на ранних этапах
- точность механического высева
- дружные всходы и отсутствие «двойничков» на поле
- однородность всходов и развития растений
- улучшенные показатели по урожайности





## ФАКТЫ О КОМПАНИИ:

- Работаем в 35 странах мира.
- Размножаем семена подсолнечника в Италии и в Испании.
- Производим семена на заводах Италии и Германии.
- 10 гибридов в портфолио на 2018—2020 годы.
- Применение новейших технологий 4D-Pheno (3-х мерная томография семян и растений с анализом данных во временном интервале).



Согласно данным маркетинговых исследований Штрубе.



Более **200 000** посевных единиц подсолнечника ООО «Штрубе Рус» поставило в Россию с 2012 года



Работаем с крупнейшими масложэкстракционными заводами России



10 гибридов в портфолио: Классика, «ИМИ, Сульфо». Устойчивые к болезням и вредителям

#### ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ:

**ООО «ПензаМолИнвест»**

Пензенская область

**ООО «Саракташхлебопродукт»**

Оренбургская область

**ООО «МТС-Калач»**

Воронежская область

**Глава КФХ Козлов В.Ф.**

Саратовская область

**ООО «Авангард»**

Оренбургская область

**КФХ «Колос»**

Липецкая область

**ЗАО «Росина»**

Ростовская область

**ООО «Сергиевское»**

Саратовская область

**ООО «Заря»**

Ставропольский край

**ООО «Агроторг Урожайное»**

Тульская область

**ООО «Летяжевское»**

Саратовская область

**ООО «Победа»**

Белгородская область

**ООО «МАЙНАГРО»**

Республика Татарстан

**ООО ТД «АГРОМИР»**

Самарская область

**ООО «Агро Виста Тамбов»**

Тамбовская область

**ООО «Красногвардейская МТС»**

Оренбургская область

**Глава КФХ Куликов А.А.**

Самарская область

**ФГБУ «Россельхозцентр»**

Краснодарский край

# ТЕХНОЛОГИИ ШТРУБЕ




# ПОДСОЛНЕЧНИК СЕЛЕКЦИИ ШТРУБЕ

- Селекция подсолнечника Штрубе ведется на собственной селекционной станции в Арансуэке (Испания).
- Размножение гибридов проводится в Италии и Испании.
- Подготовкой посевного материала занимаются на семенных заводах в Германии и Италии.
- Все рекомендуемые гибриды Штрубе проходят обязательное государственное сортоиспытание и государственную регистрацию в Российской Федерации.
- Зарегистрированные гибриды проходят дополнительные полевые испытания в различных почвенно-климатических районах Российской Федерации.

# ПЛЮСЫ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ШТРУБЕ

- + Доступный ценовой сегмент.
- + Устойчивость к заболеваниям.
- + Толерантность к гербицидам.
- + Переносимость засухи.
- + Высокая урожайность.
- + Устойчивость к современным расам заразики.
- + Высокая масличность.
- + Высокое качество семян.

## ИНКРУСТИРОВАННЫЕ СЕМЕНА STRUBE



# СХЕМА ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА (ФАЗА 2—8 НАСТОЯЩИХ ЛИСТЬЕВ)



НЕСМОТРИ НА СОВМЕСТИМОСТЬ ГИБРИДОВ С ОСНОВНЫМИ АНАЛОГАМИ, КОМПАНИЯ ШТРУБЕ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА



# УСТОЙЧИВЫЙ К ГЕРБИЦИДАМ ПОДСОЛНЕЧНИК ШТРУБЕ

## ТЕХНОЛОГИЯ CLEARFIELD (ИМИДАЗОЛИНОНЫ)



## ТЕХНОЛОГИЯ СУЛЬФО (СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ)



Гербицид Евро-Лайтнинг рекомендован только на устойчивых гибридах

Гербицид Экспресс рекомендован только на устойчивых гибридах

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2–4 листа) и 4–6 листьев у культуры

Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8 листьев у культуры и ранние фазы роста сорняков (2–4 листа)

Универсальный послевсходовый гербицид для контроля широкого спектра сорных растений

Высокая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков, включая виды осотов, бодяков, амброзии и т. д.

Уничтожение доминантных злаковых и широколиственных сорняков

Позволяет контролировать практически все широколиственные сорняки

Создает почвенный «экран»

Гибкость сроков и норм внесения

Ограничения по севообороту

Безопасность для последующих культур

Может использоваться в системах с минимальной и нулевой обработкой почвы

Может использоваться в системах с минимальной и нулевой обработкой почвы

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ХОЗЯЙСТВАМ УВЕЛИЧИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА. ПРИМЕНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ГЕРБИЦИДОВ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГИБРИДАХ, УСТОЙЧИВЫХ К КОНКРЕТНОМУ ГЕРБИЦИДУ.

# ВАШ УРОЖАЙ НА ПОЛЕ



НА КАРТЕ ПОКАЗАНЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ. ГИБРИДЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЛАСТИ ОДНОГО ЦВЕТА, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ИЗ ОБЛАСТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ДАННЫЙ СЕГМЕНТ.

# ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕГИОНАМ

## САРАТОВ + ВОЛГОГРАД + РОСТОВ + СТАВРОПОЛЬ + САМАРА + ОРЕНБУРГ + ТАТАРСТАН

|                |          |
|----------------|----------|
| ОРФЕО ШТ.....  | 3,5 т/га |
| ИМИДОР.....    | 2,9 т/га |
| ФАУСТО ШТ..... | 3,3 т/га |

## КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ + РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

|               |          |
|---------------|----------|
| ОРФЕО ШТ..... | 3,5 т/га |
| ИМИДОР.....   | 2,7 т/га |

## ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ + ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ + БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

|                |           |
|----------------|-----------|
| ОРФЕО ШТ.....  | 3,40 т/га |
| ФАУСТО ШТ..... | 4,20 т/га |

## КУРСКАЯ + ОРЛОВСКАЯ + ТАМБОВСКАЯ + ТУЛЬСКАЯ + РЯЗАНСКАЯ + БРЯНСКАЯ ОБЛАСТИ

|             |           |
|-------------|-----------|
| ИМИДОР..... | 3,78 т/га |
|-------------|-----------|

## ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. + РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ + РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

|             |           |
|-------------|-----------|
| ИМИДОР..... | 3,20 т/га |
|-------------|-----------|

НАИМЕНОВАНИЕ ГИБРИДА

| ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>ГИБРИДОВ<br>ПОДСОЛНЕЧНИКА | NEW                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | БАСКО ШТ<br>BASCO ST                                                                | ИМИДОР<br>IMIDOR                                                                    |
| Устойчивость                                | Ботритис,<br>Ризопус,<br>Вертициллез                                                | Фомоз,<br>Фомопсис                                                                  |
| Заразиха                                    | G+(H)                                                                               | F                                                                                   |
| Вегетационный<br>период (дней)              | 95-105                                                                              | 110                                                                                 |
| Тип                                         | Классика                                                                            | IMI                                                                                 |
| Регионы<br>регистрации                      | 5, 8                                                                                | 7                                                                                   |
| Позиция<br>корзинки                         |  3 |  2 |
| Цветение                                    | Раннее                                                                              | Средне-раннее                                                                       |
| Высота<br>растения, см                      | М 150—160                                                                           | Л 170—190                                                                           |
| Диаметр<br>корзинки, см                     | Л 24—29                                                                             | М 20-23                                                                             |
| Страница                                    | 20                                                                                  | 21                                                                                  |

|            | Ранний | Средний |
|------------|--------|---------|
| Цветение   | 55     | 60      |
| Созревание | 100    | 115     |

NEW

|  | ОРФЕО ШТ<br>ORFEO ST                                                                | ФАУСТО ШТ<br>FAUSTO ST                                                              | ЦЕЛСО ШТ<br>CELSO ST                                                                |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Фомоз, Фомопсис,<br>Гнили                                                           | Фомоз,<br>Фомопсис                                                                  | Гнили                                                                               |  |
|  | G+ (H)                                                                              | E                                                                                   | F+                                                                                  |  |
|  | 105-110                                                                             | 105—110                                                                             | 100-105                                                                             |  |
|  | Классика                                                                            | Сульфo                                                                              | Сульфo                                                                              |  |
|  | 5                                                                                   | 9                                                                                   | 7                                                                                   |  |
|  |  2 |  1 |  4 |  |
|  | Среднее                                                                             | Средне-раннее                                                                       | Раннее                                                                              |  |
|  | M 160—170                                                                           | L 170—190                                                                           | M 160—170                                                                           |  |
|  | m 20—23                                                                             | L 24—29                                                                             | L 24—29                                                                             |  |
|  | 19                                                                                  | 23                                                                                  | 22                                                                                  |  |

| Средне-ранний | Средне-ранний | Средне-ранний |
|---------------|---------------|---------------|
| 55            | 55-60         | 55            |
| 110           | 105-110       | 100-105       |



ПОДХОДИТ ДЛЯ  
РАННЕЙ УБОРКИ

- ☀ Подходит для раннего посева.
- ☀ Сочетание устойчивости к болезням и возбудителям современных рас.
- ☀ Стабильность урожаев.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Регионы допуска: **5**

Цветение: **СРЕДНЕ-РАННЕЕ**

## МОРФОЛОГИЯ ГИБРИДА

## РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ



Высота  
растения

**М**



Диаметр  
корзинки

**М**



Положение  
корзинки

**2**

Указанные значения являются  
ориентировочными

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА **50%**

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  
УРОЖАЙНОСТЬ **4,5Т/ГА**

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД **105-110 ДНЕЙ**

САМООПЫЛЕНИЕ **9<sup>10</sup>**

## ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА РАСТЕНИЙ

## УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Засушливые  
условия **50.000**

Условия  
повышенной  
влажности **60.000**

Рекомендованное количество  
растений на 1 гектаре

Расы возбудителя **G+ (H)**

Фомоз **+++**

Фомопсис **+++**

Белая гниль **+++**

Ржавчина **+++**

Ложная мучнистая роса **+++**

Вертициллез **+++**

(+ слабая; ++ средняя; +++ не поражен)



Подробная информация и заказ online доступны  
по QR-коду и на странице [strube.net/russia](http://strube.net/russia)

- ☀ Ранний. Жаро- и засухоустойчивый.
- ☀ Хорошая заполненность центра корзинки.
- ☀ Один из лучших гибридов по урожайности и устойчивости к болезням.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Регионы допуска: **5,8**

Цветение: **РАННЕЕ**



#### РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА **48%**

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ **5,0 Т/ГА**

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД **95-105 ДНЕЙ**  
**ОЧЕНЬ РАННИЙ**

САМООПЫЛЕНИЕ **9<sup>10</sup>**

#### МОРФОЛОГИЯ ГИБРИДА



Высота растения

**L**



Диаметр корзинки

**L**



Положение корзинки

**4**

Указанные значения являются ориентировочными

РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ

#### УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Засушливые условия **50.000**

Условия эповышенной влажности **60.000**

Рекомендованное количество растений на 1 гектаре

#### ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА РАСТЕНИЙ

Расы заразики **F + (G)**

Фомоз **+++**

Фомопсис **+++**

Белая гниль **+++**

Ржавчина **+++**

Ложная мучнистая роса **+++**

Вертициллез **+++**

(+ слабая; ++ средняя; +++ не поражался)

ВЫГОДА НА МЭЗ





☀ Сертифицированный гибрид по системе Clearfield (Евролайтинг).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Регионы допуска: **7**

Цветение: **СРЕДНЕ-РАННЕЕ**

## МОРФОЛОГИЯ ГИБРИДА



Высота растения

**L**



Диаметр корзинки

**M**



Положение корзинки

**2**

Указанные значения являются ориентировочными

## РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА **48%**

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ **4,5 Т/ГА**

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД **105 ДНЕЙ**

САМООПЫЛЕНИЕ **10<sup>10</sup>**

## ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА РАСТЕНИЙ

Засушливые условия

**65.000**

Условия повышенной влажности

**75.000**

Рекомендованное количество растений на 1 гектаре

## УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Расы заразихи **F**

Фомоз **+++**

Фомопсис **+++**

Белая гниль **+++**

Ржавчина **+++**

Ложная мучнистая роса **+++**

Вертициллез **+++**

(+ слабая; ++ средняя; +++ не поражался)



- ☀ Новый гибрид с устойчивостью к сульфонилмочевинам.
- ☀ Обладает хорошей жаро- и засухоустойчивостью.
- ☀ Самый ранний гибрид в линейке.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Регионы допуска: **7**

Цветение: **СРЕДНЕ-РАННЕЕ**



СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

#### РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА **48**

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ **4,5 Т/ГА**

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД **100-105 ДНЕЙ**

САМООПЫЛЕНИЕ **8<sup>10</sup>**

#### МОРФОЛОГИЯ ГИБРИДА



Высота растения

**M**



Диаметр корзинок

**L**



Положение корзинок

**4**

Указанные значения являются ориентировочными

РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ

#### УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Расы заразихи **F+**

Фомоз **+++**

Фомопсис **+++**

Белая гниль **+++**

Ржавчина **+++**

Ложная мучнистая роса **+++**

Вертициллез **+++**

(+ слабая; ++ средняя; +++ не поражался)

#### ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА РАСТЕНИЙ

Засушливые условия **50.000**

Условия повышенной влажности **60.000**

Рекомендованное количество растений на 1 гектаре

ВЫГОДА НА МЭЗ





- ☀ Лидер по урожайности
- ☀ Новый гибрид с устойчивостью к сульфонилмочевинам.
- ☀ Хорошее экономичное решение контроля над сорняками.
- ☀ Отличная устойчивость к фомозу и фомопсису.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Регионы допуска: **9**

Цветение: **СРЕДНЕ-РАННЕЕ**

### МОРФОЛОГИЯ ГИБРИДА

### РЕЗУЛЬТАТ НА ПОЛЕ



Указанные значения являются ориентировочными

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА **48%**

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ **4,5 Т/ГА**

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД **105-110 ДНЕЙ**

САМООПЫЛЕНИЕ **9<sup>10</sup>**

### ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА РАСТЕНИЙ

### УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Засушливые условия **50.000**

Условия эповышенной влажности **60.000**

Рекомендованное количество растений на 1 гектаре

Расы заразики **E**

Фомоз **+++**

Фомопсис **+++**

Белая гниль **+++**

Ржавчина **+++**

Ложная мучнистая роса **+++**

Вертициллез **+++**

(+ слабая; ++ средняя; +++ не поражался)



Подробная информация и заказ online доступны по QR-коду и на странице [strube.net/russia](http://strube.net/russia)





Пензенская обл.,  
Республика Мордовия,  
Ульяновская обл.  
**Алексеев Алексей**  
a.alexseev@strube.ru  
+7 900 326 73 00



Республика Татарстан,  
Республика  
Башкортостан  
**Дмитриев Артем**  
a.dmitriev@strube.ru  
+7 952 047 22 43



Краснодарский край,  
Ставропольский край,  
Белгородская и  
Волгоградская обл.  
**Хорошилов Андрей**  
a.horoshilov@strube.ru  
+7 910 320 75 39



Воронежская обл.,  
Липецкая обл.  
**Матысин Алексей**  
a.matysin@strube.ru  
+7 920 240 56 39



Тамбовская обл.,  
Тульская обл.,  
Рязанская обл.  
**Чербаев Евгений**  
e.cherbaev@strube.ru  
+7 920 478 75 25



Курская обл.,  
Орловская обл.  
**Полупан Сергей**  
s.polupan@strube.ru  
+7 906 576 47 48



Самарская обл.  
**Лагутин Николай**  
n.lagutin@strube.ru  
+7 927 902 32 91



Саратовская обл.  
**Косолапов Николай**  
n.kosolapov@strube.ru  
+7 937 813 2815



Саратовская обл.  
**Васин Александр**  
a.vasin@strube.ru  
+7 927 725 3213

АГРОСЕРВИС ШТРУБЕ:



Руководитель  
агросервиса  
**Владимир Иванов**  
v.ivanov@strube.ru  
+7 960 690 43 33



Исследования  
и научная деятельность  
**Цыкалов Александр**  
a.tsykalov@strube.ru  
+7 950 769 11 49



Северный Кавказ  
**Горин Александр**  
a.gorin@strube.ru  
+7 918 411 12 97



Генеральный  
директор  
**Ткаченко Олег**  
info@strube.ru  
+7 916 211 01 60



Подсолнечник  
**Ивахненко Виталий**  
v.ivakhnenko@strube.ru  
+7 918 297 94 27



Пшеница  
**Гниломедов Григорий**  
g.gnilemedov@strube.ru  
+7 916 297 30 19

РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ:



Центральный регион  
**Фомин Алексей**  
a.fomin@strube.ru  
+7 980 537 19 04



Руководитель проектов  
**Лобачев Сергей**  
s.lobachev@strube.ru  
+7 930 086 33 82



Поволжье, Урал  
**Дубачинский Сергей**  
s.dubachinskiy@strube.ru  
+7 987 771 71 17



Сахарная кукуруза  
**Пекшев Алексей**  
a.pekshev@strube.ru  
+7 915 347 95 66



Маркетинг и инновации  
**Волошенко Константин**  
k.voloshenyuk@strube.ru  
+7 926 226 01 07



Республика Татарстан,  
Республика  
Башкортостан  
**Фаттахов Ильнур**  
i.fattahov@strube.ru  
+7 917 876 01 20



Продакт менеджер  
по подсолнечнику  
**Пчелинцева Елена**  
e.pchelintseva@strube.ru  
+7 919 131 73 77



Центральный офис  
ООО «Штрубе Рус»  
117041, г. Москва,  
ул. Адмирала Лазарева 72 пом. VII  
тел.: +7 495 514 0282  
info@strube.ru  
www.strube.ru