

ЕКСКЛЮЗИВНІ
Гібриди
Соняшнику
2023-2024

Шановні друзі, колеги, партнери!

Соняшник залишається однією з найприбутковіших культур для українських аграріїв.

Для того, щоб запропонувати вам адаптивні, високоврожайні та пластичні гібриди відмінної якості, компанія Strube, яка являється частиною Deleplanque Group, постачає високоякісну лінійку соняшнику, що вирощується в найкращих регіонах Європи.

Strube — це європейська генетика з німецькою якістю. Тобто селекція відбувається в Іспанії, виробляється по світу, а контроль якості проводиться в Німеччині, де серйозна науково-дослідницька база і контроль якості. Гібриди з лінійки соняшнику Strube пройшли ретельний відбір в умовах Іспанії. Було обрано найкращі за посухостійкістю, стійкістю до хвороб, толерантністю до вочку та з високим потенціалом.

Надалі гібриди пройшли ґрунтовні випробування вже на теренах України.

Основний акцент в адаптації соняшників для українського ринку зроблено на посухостійкості, жаростійкості та стійкості до хвороб. Крім того, до цієї лінійки входять гібриди лінолеві та високоолеїнові під класичну, сульфю та технологію Clearfield Plus.

В цьому каталозі Ви зможете ознайомитись з характеристиками тих гібридів, які будуть доступні до придбання у 2023-24 рр.



Зміст

Районування гібридів соняшника	4
Характеристика гібридів Strube	5
Класичні гібриди	
БАСКО ШТ	7
САРЕЛІЯ	8
Гібриди для технології Сульфю	
ФАУСТО ШТ	9
МЕРО ШТ	10
Гібриди для технології Євролайтнінг та Євролайтнінг Плюс	
КОНКВЕСТ	11
Високо-олеїнові гібриди	
СОРЕС ШТ	12
Показники врожайності	13
Контакти	15

Соняшник стійкий вибір



Соняшник врожай для майбутнього

Як селекціонеру рослин, наша місія полягає в тому, щоб надати рішення для фермерів і переробників, щоб протистояти викликам, спричиненим кліматичними, політичними та соціальними змінами, одночасно виробляючи високоякісний урожай. Частиною рішення є різноманітна та стійка сівозміна, а соняшник приносить різноманітні переваги



Сильніше співпраця з FMC

Збереження ресурсів має вирішальне значення для всіх нас. Ми є частиною інноваційного ланцюга, який забезпечує постійний прогрес у сільському господарстві. Це стосується і ресурсозберігаючих систем захисту рослин. Ми з гордістю повідомляємо, що частина нашого портфоліо соняшнику тепер офіційно кваліфікована для гербіцидів марки FMC Express™.



Штрубе думає далі: OptiStart®

Однорідні сходи – перший крок до гарного врожаю. З нашою технологією гранулювання насіння OptiStart® набагато легше досягти однорідних і швидких сходів на полі. Коли ми працюємо разом, ми будемо прогресувати разом.




Strube D&S прагне більшого – ми продовжуватимемо шукати нові та інноваційні рішення. Ми хочемо працювати рука об руку з фермерами, щоб забезпечити їхній економічний успіх. Strube D&S GmbH — німецький селекціонер і виробник насіння. Як частина Deleplanque-Group і разом із SUET як іншим партнером, ми постачаємо насіння цукрових буряків, пшениці, соняшнику, нуту, сої та інших культур у понад 35 країн.



Районування гібридів соняшника

ПРІОРИТЕТНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ В РАЙОНУВАННІ СОНЯШНИКА



ЗОНА 1 - Північна частина	ЗОНА 2 - Центральна частина	ЗОНА 3 - Південна частина
1 Стабільність врожаю 2 Стиглість (90 - 115 днів) 3 Стійкість до стресу, особливо холодостійкість 4 Вміст олій (олійність) 5 Толерантність до фомозу/фомопсису, НБР 6 Стійкість до вовчка	1 Високий потенціал та стабільність врожаю 2 Вміст олій (олійність) 3 Адаптація під насичення соняшником в 2-3-річній сівозміні 4 Толерантність до фомозу/фомопсису, НБР, склеротинії 5 Стійкість до вовчка	1 Стабільність врожаю та потенціал 2 Вміст олій (олійність) 3 Стійкість до посухи та жаростійкість 4 Стійкість до агресивних рас вовчка 5 Можливість вирощування на бідних та проблемних ґрунтах 6 Адаптація під насичення соняшником в 2-3-річній сівозміні 7 Можливість використання No-Till, Mini-Till 8 Толерантність до фомозу/фомопсису, НБР, склеротинії



Характеристика гібридів Strube

Технологія		Класична		Exp ress		ЄВРОЛАЙТІНГ ПЛЮС (CLP)	ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ
Гібрид		БАСКО ШТ	САРЕЛІЯ	ФАУСТО ШТ	МЕРО ШТ	КОНКВЕСТ	СОРЕС ШТ
Тип гібриду		Простий	Простий	Простий	Простий	Простий	Простий
Тип олії		Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Олеїновий
Тип адаптивності		Помірно-інтенсивний	Інтенсивний	Екстенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний
Група стиглості		Ранньо-стиглий	Середньо-стиглий	Середньо-ранній	Середньо-ранній	Середньо-стиглий	Середньо-пізній
Вегетаційний період, днів		100 - 105	111 - 115	106 - 110	106 - 110	111 - 115	116 - 120
Цвітіння		Раннє	Середнє	Середнє	Середнє	Середнє	Середнє
Висота рослин, см		145 - 165	160 - 180	155 - 175	160 - 170	160 - 180	180 - 190
Кошик	Нахил	Напів-похилий	Похилий	Напів-стоячий	Похилий	Напів-стоячий	Похилий
Толерантність до хвороб та стресових факторів (бал)	Технологія захисту	-//-	-//-	SU	SU	IMI+	IMI+
	Посухо-жаростійкість	9	8	8	8	8	7
	Вилягання	9	8	9	9	8	7
	Обсипання	9	9	9	9	9	8
	Вовчок (Orobanche)	F	G	E	F	E	E
	Несправжня борошниста роса (Pogonospora)	9	9	8	9	9	9
	Гниль біла (Sclerotinia)	8	8	7	7	8	9
	Гниль сіра (Botrytis)	9	8	9	9	9	8
	Іржа (Puccinia)	7	7	8	8	9	9
	Фомоз (Phoma)	8	9	8	8	8	8
	Фомопсис (Phomopsis)	8	9	8	8	8	8
Олійність, %		49-50	до 50	50-53	49-53	48-54	48-50
Рекомендована зона вирощування	Зона 1	√√√	√√	√√√	√√	√√	√√
	Зона 2	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√
	Зона 3	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√
Рекомендована густота рослин до збирання, тис.шт/га	Недостатнє зволоження	50 - 55	50 - 55	45 - 50	45 - 50	50 - 55	50 - 55
	Оптимальне зволоження	55 - 60	55 - 60	50 - 55	50 - 55	55 - 60	55 - 60
	Достатнє зволоження та зрошення	60 - 65	60 - 65	55 - 60	55 - 60	60 - 65	60 - 65

Наведені дані можуть варіювати в залежності від зони та умов вирощування



ВМІСТ ОЛІЇ

49-50%

НАХИЛ КОШИКА

Напівпохилий

145-165 см

ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F

РАСА ВОВЧКА

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	9
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	7
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

БАСКО ШТ

КЛАСИЧНИЙ / ЛІНОЛЕВИЙ

- ✳ Ранньостиглий гібрид, адаптований для всіх зон вирощування
- ✳ Висока якість запилення
- ✳ Найбільш пластичний до різних типів ґрунтів та технологій вирощування

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Ранньостиглий
Період вегетації	100 - 105 днів
Цвітіння	Раннє

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



САРЕЛІЯ

КЛАСИЧНИЙ / ЛІНОЛЕВИЙ

- ✳ Висока стійкість до комплексу основних хвороб
- ✳ Відмінно реагує на інтенсивну технологію
- ✳ Потужна сила росту на початкових етапах
- ✳ Толерантний до агресивних рас вовчка

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньостиглий
Період вегетації	111-115 днів
Цвітіння	Середнє

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



ВМІСТ ОЛІЇ

до 50%

НАХИЛ КОШИКА

Похилий

160-180 см

ВИСОТА РОСЛИНИ

A-G

РАСА ВОВЧКА

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	7
Толерантність до Фомозу	9
Толерантність до Фомопсису	9



ФАУСТО ШТ

СУЛЬФО / ЛІНОЛЕВИЙ

- ★ Один з найкращих високопродуктивних гібридів в сульфо-технології
- ★ Ідеально підходить для легких ґрунтів
- ★ Стабільний врожай навіть за несприятливих умов
- ★ Має відмінну стійкість до перепаду середньодобових температур

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньоранній
Період вегетації	106-110 днів
Цвітіння	Середнє

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



50-53%

НАХИЛ КОШИКА



Напівстоячий

155-175 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-E



РАСА ВОВЧКА

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	8
Толерантність до Гнилі білої	7
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



МЕРО ШТ

СУЛЬФО / ЛІНОЛЕВИЙ

- ★ Добре поєднує толерантність до нових рас Вовчка в сульфо-технології
- ★ Високий потенціал врожаю та вмісту олії
- ★ Добрий комплекс стійкості до більшості хвороб

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньоранній
Період вегетації	106-110 днів
Цвітіння	Середнє

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



49-53%

НАХИЛ КОШИКА



Похилий

160-170 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



ВМІСТ ОЛІЇ



49-53%

НАХИЛ КОШИКА



Похилий

160-170 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F



РАСА ВОВЧКА

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	7
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	9
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

КОНКВЕСТ

ЕВРОЛАЙТНІНГ ПЛЮС (CLP) / ЛІНОЛЕВИЙ

- Найкращий врожай в технології Євролайтнінг Плус
- Відмінна сила росту на початкових етапах
- Відмінна стійкість до комплексу хвороб
- Придатний до різних технологій вирощування

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньостиглий
Період вегетації	111-115 днів
Цвітіння	Середнє

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



СОРЕС ШТ

ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ / ОЛЕЇНОВИЙ

- Відмінне поєднання новітньої технології в високо-олеїновому сегменті
- Стійкий до нових рас несправжньої борошнистості роси
- Рекомендований для лісостепу та степу

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньопізній
Період вегетації	116-120 днів
Цвітіння	Середнє

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ




СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	7
Вилягання	7
Обсипання	8
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	9
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	9
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

Показники врожайності

за базової вологості 7%


Вінницька



Донецька




Дніпропетровська




Запорізька




Київська




Кіровоградська




Миколаївська




Рівненська




Одеська




Полтавська



Хмельницька




Харківська




Чернігівська




Черкаська



Сумська



Тернопільська





Забезпечте максимальний урожай завдяки **Express™-технології**

Express™ є торговою маркою корпорації FMC або її філії,
яка використовується за ліцензією Strube D&S GmbH та дочірніх компаній.



Ефективно
контролює
найбільш проблемні
бур'яни
на соняшнику.

- Амброзія (2 листки)
- Гірчак, види
- Біфора промениста
- Вероніка, види
- Волошка синя
- Галінсога
- Гірчиця польова
- Грицики звичайні
- Дворяник, киди
- Дурман звичайний
- Осот, види
- Нетреба звичайна (2 листки)
- Жовтозілля звичайне
- Зірочник середній
- Канатник Теофраста
- Крופива глуха
- Кучерявець Софії
- Лобода, види
- Підмареник чіпкий
- Празелень звичайна
- Редька дика
- Ромашка, види
- Рутка лікарська
- Свиріпа звичайна
- Талабан польовий
- Триреберник
- Щириця, види
- Падалиця традиційного соняшнику, ріпаку
- Лутига розлога
- Мак дикий
- Морква дика
- Незабудка польова
- Жабрій, види

Контакти

Агродепартамент Strube Україна

КОМПЕТЕНТНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НАДАДУТЬ:

ТЕРЗІ Іван Олександрович

керівник напрямку
олійних культур
☎ : (095) 535 90 07
✉ : i.terzi@strube.com.ua

ШЕВЧУК Роман Анатолійович

Регіональний менеджер
Захід
☎ : 066 003 45 56
✉ : R.Shevchuk@strube.com.ua

ДЕРЕВ'ЯНКО Ігор Васильович

Регіональний менеджер
Північ-Схід
☎ : 050 404 20 14
✉ : I.Derevianko@strube.com.ua

ЯСКОВЕЦЬ Юрій Остапович

Регіональний менеджер
Північ-Захід
☎ : 050 314 60 99
✉ : Y.Yaskovets@strube.com.ua



ТОВ «Штрубе Україна ГМБХ», Тел.: +380 44 536 16 69, www.strube.com.ua

