



strube



Насіння. З 1877 р.

**ОСНОВИ
УСПІШНОГО
ВИРОЩУВАННЯ**

ПШЕНИЦІ

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ – ЦЕ КЛЮЧ ДО ВАШОГО УСПІХУ!

Компанія «Штрубе» - це німецько-французьке інноваційне підприємство, яке займається селекцією та насінництвом рослин з використанням власного генетичного ресурсу. Компанію засновано у 1877 році, наразі Штрубе має власні представництва у 35-ти країнах світу. Головний офіс знаходиться в Зеллінген (Німеччина). Як частина французької групи компаній «Делапланк» та компанії «Зует», Штрубе постійно розширює свою лінійку продукції. У дочірньому дослідницькому центрі «Штрубе Резерч» створюються нові сорти та гібриди з врахуванням індивідуальних умов вирощування та селекції, найсучасніші наукові напрацювання випробовуються на практиці.

Зосередженість на інноваціях, випробовуванні нових сортів і гібридів у різних регіонах з мінливим кліматом та різноманітними якостями дає можливість клієнту обрати продукт, який максимально відповідає його потребам. До того ж клієнти отримують повний агрономічний супровід, адже спеціалісти Штрубе мають як науковий, так і практичний досвід.

Сучасний світ, кліматичні умови та потреби споживачів невинно змінюються, а тому головним завданням компанії є забезпечення економічно вигідної та екологічно чистої лінійки продукції. Ми розвиваємося разом із нашими клієнтами, і ключовим фактором для ефективного розвитку є селекція, орієнтована на результат.

Оскільки наслідки глобальної зміни клімату стають все відчутнішими, спеціалісти компанії миттєво реагують на нові виклики, задовольняючи потреби клієнтів у якісному насінні.

Без сумніву, рослини повинні мати високу продуктивність в складних умовах. Тому наша компанія забезпечує правильне використання добрив, розширений спектр засобів захисту рослин та постійне пристосування до кліматичних змін.

В асортименті «Штрубе» представлено різні сорти озимої та ярої пшениці, а також пшениці дворучки.

Наша озима пшениця має високі якісні показники та унікальні властивості: високу стійкість до основних хвороб – борошнистої роси, септоріозів листя і колосу, бурої іржі, фузаріозу колоса. Наші сорти мають високу стійкість до проростання «на корені» у випадку затяжних опадів у період дозрівання.

Яра пшениця від компанії «Штрубе» ідеально підходить для весняного посіву, висока якість насіння забезпечує ранню появу сходів та рівномірний ріст і розвиток рослин, що забезпечує повну реалізацію потенціалу продуктивності сортів.

За несприятливих погодних умов або при пізньому дозріванні попередніх культур, висів озимої пшениці стає неможливим. У таких випадках пшениця дворучка стає вирішенням проблеми, адже має широке «вікно» висіву. Вона поєднує в собі морозостійкість та високий потенціал врожайності озимої пшениці з якістю та швидкістю проростання ярої пшениці. Вдале поєднання цих якостей забезпечує велике «вікно» висіву, адже немає потреби у яровизації.

Насіння Штрубе – це продукція високої якості, яка є запорукою гарантованих високих врожаїв. Потужні сорти пшениці повністю відповідають запитам та потребам наших клієнтів, а також сприяють економічному успіху аграріїв.

СОРТИ ПШЕНИЦІ СЕЛЕКЦІЇ КОМПАНІЇ «ШТРУБЕ»

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

АКРАТОС	2
ГЛАУКУС	3
ПЛАТІН	4
РУМОР	5
ФАУСТУС	6
ПОНТІКУС	7
ОРТЕГУС	8
РОТАКС	9
САЛАСАР	10
ФАГУС	11

ПШЕНИЦЯ ДВОРУЧКА

МАТТУС	12
ГРАНУС	13
ЛЕННОКС	14

ПШЕНИЦЯ ЯРА

АЛБАСІН	15
ВАРІУС	16
ШТРУ 093736c4	17
ПС ПЕТРА	18

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ	19
--	----

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УСПІШНОГО ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ	24
---	----

КОНТАКТИ	35
----------------	----

- Середньорання пшениця, висота рослини - середня;
- Високий потенціал врожайності за любых стресових умов;
- Висока стійкість до хвороб і посухи;
- Можливо висівати за пізніх строків сівби;
- Пластичний сорт – висока продуктивність за мінімального удобрення і захисту.

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м2	590-650
Кількість зерен в колосі, шт.	До 31
Маса 1000 насінин, г	До 46 г
Потенціал продуктивності, т/га	8,0 – 9,0



Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

[illegible]

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	2,50 – 3,00
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,50 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Рекомендовані строки сівби	15.09 – 25.10

ГЛАУКУС

- Високоякісний середньоранній сорт;
- Має високу стійкість до хвороб, посухи і пізніх строків сівби;
- Пластичний сорт, що забезпечує високу врожайність за мінімального удобрення і захисту;
- Має високу конкурентоздатність до бур'янів;
- Не вибагливий до технологій вирощування.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середньо-висока
Строк колосіння	середній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м ²	600-650
Кількість зерен в колосі, шт.	До 31
Маса 1000 насінин, г	До 46,6 г
Потенціал продуктивності, т/га	9,0 – 10,0

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,00 – 3,50
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,60 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Рекомендовані строки сівби	15.09 – 15.10



ПЛАТІН

- Сорт інтенсивного типу;
- Формування стабільно високої врожайності;
- Добрий налив зерна;
- Рекомендований для зон Лісостепу і Полісся;
- Висока посухостійкість.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м ²	600-610
Кількість зерен в колосі, шт.	До 46
Маса 1000 насінин, г	До 49 г
Потенціал продуктивності, т/га	10,0 – 11,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,60 – 4,00
Оптимальний (25.09 – 05.10)	4,00 – 4,50
Пізній (05-15.10)	4,50 – 6,00
Рекомендовані строки сівби	10.09 – 15.10

РУМОР

- Сорт інтенсивного типу;
- Високоврожайний із раннім строком дозрівання;
- Рекомендований для всіх зон вирощування;
- Високий коефіцієнт кущення;
- При інтенсивній технології рекомендуємо застосування регуляторів росту.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середньо - ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середньо - ранній
Кількість колосків, шт./м ²	600-610
Кількість зерен в колосі, шт.	До 40
Маса 1000 насінин, г	До 46 г
Потенціал продуктивності, т/га	9,0 – 10,0

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,60 – 4,00
Оптимальний (25.09 – 05.10)	4,00 – 4,50
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,60
Рекомендовані строки сівби	15.09 – 15.10



ФАУСТУС

- Високоврожайний стабільний сорт пшениці;
- Має високу стійкість до хвороб і посухи;
- Висока стійкість до вилягання;
- Має високу конкурентоздатність до бур'янів.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середньо-пізній
Стиглість (строк дозрівання)	середньо-пізній
Кількість колосків, шт./м ²	590-620
Кількість зерен в колосі, шт.	До 32
Маса 1000 насінин, г	До 50 г
Потенціал продуктивності, т/га	9,0 – 10,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,00 – 3,50
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,50 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Рекомендовані строки сівби	15.09 – 15.10

- Високоякісний сорт пшениці для харчової промисловості;
- Пластичний, добре вдається при висіванні після ріпака, цукрових буряків і кукурудзи;
- Висока стійкість до вилягання;
- Високий вихід борошна;
- Високопродуктивний сорт інтенсивного типу.

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середньо-коротка
Строк колосіння	середній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м2	620-650
Кількість зерен в колосі, шт.	До 34
Маса 1000 насінин, г	До 46 г
Потенціал продуктивності, т/га	9,0 – 10,0

[illegible][illegible]

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,00 – 3,50
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,50 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Рекомендовані строки сівби	15.09 – 15.10

ОРТЕГУС

- Високоякісний середньо-ранній сорт пшениці;
- Значний приріст врожайності за мінімального удобрення і захисту;
- Має високу конкурентоздатність до бур'янів;
- Високопродуктивний сорт інтенсивного типу.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середньо - ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середньо - ранній
Кількість колосків, шт./м2	620-650
Кількість зерен в колосі, шт.	До 35
Маса 1000 насінин, г	До 48 г
Потенціал продуктивності, т/га	10,0 – 11,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,00 – 3,50
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,50 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Рекомендовані строки сівби	15.09 – 15.10

- Високровжайний, середньо-ранній сорт пшениці, низькорослий;
- Висока стійкість до хвороб і вилягання;
- Рекомендований для всіх зон вирощування;
- Новий тип колосу;
- Підвищена зимостійкість;
- Високий бал кушення.

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середньо-ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середньо-ранній
Кількість колосків, шт./м2	610-620
Кількість зерен в колосі, шт.	До 35
Маса 1000 насінин, г	До 50 г
Потенціал продуктивності, т/га	10,0 – 11,0

[illegible][illegible]

Строк сіви	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,00 – 3,50
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,50 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Рекомендовані строки сіви	15.09 – 15.10

САЛАСАР

- Комерційний сорт для вирощування в Румунії, Угорщині, Південному Сході Європи та Україні;
- Характеризується високою інтенсивністю кущіння, стійкістю до вилягання та середньою висотою рослини
- Висока стійкість до основних хвороб листків і колоса
- Має високу зимостійкість та посухостійкість
- Характеризується високим числом падіння та середнім вмістом протеїну

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середньо - пізній
Стиглість(строк дозрівання)	середньо - пізній
Кількість колосків, шт./м ²	650-750
Кількість зерен в колосі, шт.	38-42
Маса 1000 насінин, г	40-45
Потенціал продуктивності, т/га	До 11,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Уміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Переноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН. ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,00 – 3,50
Оптимальний (25.09 – 05.10)	3,50 – 4,00
Пізній (05-15.10)	4,50 – 5,50
Строк сівби	15.09 – 15.10

- Сорт інтенсивного типу;
- Високоврожайний середньо-ранній сорт пшениці;
- Найбільш посухостійкий;
- Невибagliвий до попередників.

Тип розвитку	озима
Висота рослин	середня
Строк колосіння	ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середньо - ранній
Кількість колосків, шт./м2	600-610
Кількість зерен в колосі, шт.	До 38
Маса 1000 насінин, г	До 50 г
Потенціал продуктивності, т/га	9,0 – 10,0

[illegible]

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока	
Борошниста роса										
Жовта іржа										
Бура іржа										
Пероноспороз										
Септоріоз листя										
Септоріоз колосу										
Фузаріоз колосу										
Посухостійкість										
Зимостійкість	</									

Строк сіви	млн.зерен/га
Ранній (15-25.09)	3,60 – 4,00
Оптимальний (25.09 – 05.10)	4,00 – 4,50

МАТТУС

- Для осінньо-весняного посіву (дворучка);
- Рання поява сходів;
- Добрий налив зерна;
- Стійкість до посухи і вилягання.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	дворучка
Висота рослин	середня
Строк колосіння	середній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м ²	560-590
Кількість зерен в колосі, шт.	До 31
Маса 1000 насінин, г	До 51 г
Потенціал продуктивності, т/га	8,0 – 9,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Сівба восени (10.10 - 25.11)	4,50 - 5,50
Сівба весною (до 15.04)	4,00 - 4,50
Рекомендовані строки сівби	10.10 - 15.04

- | Строк сівби | млн.зерен/га |
|------------------------------|---------------|
| Сівба восени (10.10 - 25.11) | 4,50 - 5,50 |
| Сівба весною (до 15.04) | 4,00 – 4,50 |
| Рекомендовані строки сівби | 10.10 – 15.04 |



ЛЕННОКС

- Для осінньо-весняного посіву (дворучка);
- Добре поєднання стабільності і здоров'я;
- Рекомендований для зони з високим волого забезпеченням;
- Рання поява сходів;
- Висока посухостійкість.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	дворучка
Висота рослин	середня
Строк колосіння	ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м ²	560-590
Кількість зерен в колосі, шт.	До 31
Маса 1000 насінин, г	До 45 г
Потенціал продуктивності, т/га	8,0 – 9,5



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Сівба восени (10.10 - 25.11)	4,50 - 5,50
Сівба весною (до 15.04)	4,00 - 4,50
Рекомендовані строки сівби	10.10 – 15.04

АЛБАСІН

- Для весняного посіву (яра);
- Стабільна врожайність за будь яких умов;
- Високий уміст білка і вихід борошна;
- Висока стійкість до хвороб.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	Яра
Висота рослин	середня
Строк колосіння	ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м ²	560-580
Кількість зерен в колосі, шт.	До 36
Маса 1000 насінин, г	До 50 г
Потенціал продуктивності, т/га	8,5 – 9,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Сівба весною (до 15.04)	4,00 – 4,50
Рекомендовані строки сівби	01.04-15.04

ВАРІУС

- Для весняного посіву (яра);
- Висока стабільна врожайність;
- Висока стійкість до хвороб
- Рання поява сходів;
- Для всіх зон вирощування.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип розвитку	Яра
Висота рослин	середня
Строк колосіння	ранній
Стиглість (строк дозрівання)	середній
Кількість колосків, шт./м ²	560-580
Кількість зерен в колосі, шт.	До 31
Маса 1000 насінин, г	До 36 г
Потенціал продуктивності, т/га	8,5 – 9,0



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Вміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пероноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН.ЗЕРЕН/ГА

Строк сівби	млн.зерен/га
Сівба весною (до 15.04)	4,00 – 4,50
Рекомендовані строки сівби	01.04-15.04

ШТРУ 093736с4

- Для весняного посіву
- Висока стабільна врожайність
- Висока стійкість до хвороб
- Високий бал кущення

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип розвитку	Яра
Висота рослин	середня
Колос	безостий
Строк Колосіння	середній
Строк Дозрівання	середній
Кількість колосків, шт./м²	560 - 590
Кількість зерен у колосі, шт	до 30
Маса 1000 насінин, г	до 50
Потенціал врожайності, т/га	8,0 - 9,0

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Показники якості зерна	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Уміст сирого протеїну	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коефіцієнт седиментації	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Число падіння	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вихід борошна	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Об'ємний вихід хліба	●	●	●	●	●	●	●	●	●

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Стресовий фактор	низька	2	3	4	5	6	7	8	висока
Борошниста роса	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Жовта іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бура іржа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Переноспороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз листя	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Септоріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фузаріоз колосу	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Посухостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ГУСТОТА ТА СТРОКИ ПОСІВУ

Строк сівби	млн.зерен/га
Норма висіву (опт. строки)	4,0 -4,5 млн. сх. зерен/га
Строки посіву	01.04 - 15.04



ПС ПЕТРА

- Для весняного посіву
- Висока стабільна врожайність
- Висока стійкість до хвороб
- Добре реагує на внесення регуляторів росту рослин

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип розвитку	Яра
Висота рослин	вище середньої
Колос	остиста форма
Строк Колосіння	середньо-ранній
Строк Дозрівання	середній
Кількість колосків, шт./м ²	550 - 570
Кількість зерен у колосі, шт	до 30
Маса 1000 насінин, г	до 50
Потенціал врожайності, т/га	8,0 - 8,5

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

[illegible]

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

[illegible]

ГУСТОТА ТА СТРОКИ ПОСІВУ

Строк сівби	млн.зерен/га
Норма висіву (опт. строки)	4,0 -4,5 млн. сх. зерен/га
Строки посіву	01.04 - 15.04

